

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБУ «Россельхозцентр»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
РОССЕЛЬХОЦЕНТРА № 5-2025



Исх.: № ____ от 23 июня 2025 год

Исп. Ведущий агроном по защите растений Д.А. Полномочнов.

Адрес: 664013, г. Иркутск, ул. Томсона, д. 3, тел./факс 47-92-27

E-mail: rsc_irk@mail.ru.

НЕСТАДНЫЕ САРАНЧОВЫЕ (ИМАГО)



Отдел защиты растений
филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Иркутской
области сообщает, что при
проведении фитосанитарных
обследований в Боханском,
Осинском, Эхирит-Булагатском
районе зафиксировано появление
имаго нестадных форм
саранчовых.

Саранчовые вредители многоядны, вредят имаго и личинки, грубо объедая листья, в связи, с чем наносят в отдельные годы существенную вредоносность посевам сельскохозяйственных культур.

В связи с установившейся сухой жаркой погодой, без осадков в южных и центральных районов следует ожидать увеличения численности и проявления очажной вредоносности нестадных саранчовых в период вегетации.

Специалистам районных, межрайонных отделов и агрономическим службам хозяйств усилить мониторинг за численностью саранчовых, при обследовании следует уделить особое внимание сельскохозяйственным культурам, сенокосам, пастбищам, а также естественным угодьям, целинным и бросовым участкам, находящимся вблизи посевов.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. Обработки инсектицидами против саранчовых вредителей проводятся против личинок 1-3 возраста, и не осуществляются против более старших возрастов и имаго. При сплошном и равномерном заселении обработке подлежит всё поле, а при очажном или краевом заселении проводятся локальные. Обработка инсектицидами проводится согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ в 2025 г.». При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и

технику безопасности, и руководствоваться требованиям СП 2.2.3670-20, СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21, особенно вблизи пасек.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел защиты растений по тел.: 8 (3952) 47-92-27 а также в районные и межрайонные отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области.

Экономический порог вредоносности (ЭПВ) по нестадным саранчовым (кобылки, травянки, коньки) – 10-15 личинок/м²; сибирская кобылка – 2-5 личинок/м². Наиболее эффективны химические обработки против личинок младших возрастов.